



Direction de la santé  
Bureau de veille sanitaire

# Bulletin de Surveillance Sanitaire

## Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

Données du 14 au 20 janvier 2013  
(Semaine 03)

### A RETENIR

#### Syndrome grippal

- Activités syndromique et virologique faibles.

#### Syndrome dengue

- Activité syndromique faible ; aucun cas confirmé sur 24 prélèvements analysés.

#### Diarrhées

- Activité modérée. A noter un pic en semaine 2, correspondant à la TIAC signalée le 11/2, rapportée à une **intoxication par staphylocoque enterotoxinogène** ayant concerné 56 malades, dont une majorité d'enfants

#### Fièvre

- Activité faible.

### AUTRES ACTUALITES LOCALES

#### Salmonellose

- Quelques cas sont sporadiquement signalés (S. enteritidis et autres types)  
- Les mesures de contrôle au sein des élevages incriminés continuent à se mettre en place (Arrêtés n°1649 et n°1651 du 15 novembre 2012).  
- Par mesure de précaution, il est encore recommandé de consommer les œufs bien cuits : blanc et jaune (cuisson 5 minutes au minimum à 65°C).

#### Leptospirose

- Suite aux importants épisodes pluvieux, le risque de leptospirose est toujours très important.  
- **Les mesures de prévention primaire consistent à éviter le contact de la peau avec de l'eau ou de la boue pouvant être souillées par les urines d'animaux. En cas de signes évocateurs, une consultation rapide pour prélèvement et traitement est recommandée.**  
- Depuis début 2013 et au 25/01, 10 cas de leptospirose ont été confirmés (aucun décès) ; 15 cas avaient été déclarés en décembre 2012  
- Sur le total des 25 cas enregistrés depuis le début de l'épidémie, 19 étaient des hommes, 12 ont été hospitalisés (dont 6 en Réa), 1 est décédé (en décembre).

### ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

(sources : InVS, PacNet, OMS, ProMed, autres)




#### Dengue - Nouvelle-Calédonie

- Depuis le début de la circulation du virus DEN I en Nouvelle-Calédonie en septembre 2012, 1200 cas ont été confirmés, dont 727 en janvier et 296 en S3  
- L'ensemble du territoire semble être concerné  
- **Il est recommandé à l'ensemble des personnels de santé de Polynésie une vigilance accrue face à toute suspicion clinique de dengue, en particulier chez des personnes ayant voyagé en Nouvelle-Calédonie dans la semaine précédente.**  
- Pour information complémentaire, consultez le site internet de la DASS Nouvelle-Calédonie : [http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/observatoire\\_sante/veille\\_sanitaire/Dengue](http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/observatoire_sante/veille_sanitaire/Dengue)



#### Grippe

- L'épidémie de grippe A (H3N2) est en cours aux Etats-Unis.  
- La Nouvelle-Zélande et l'Australie rapportent une activité grippale minimale.  
- En France, une épidémie de grippe est en cours, avec plusieurs virus identifiés




## Grippe





## Fièvre isolée




## Dengue



## Diarrhées



## Indicateurs d'activité



### Bulletin téléchargeable sur les sites suivants :

- Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique [http://www.spc.int/phs/PPhSN/Surveillance/Routine\\_reports.htm](http://www.spc.int/phs/PPhSN/Surveillance/Routine_reports.htm)
- Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>

### Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelles

- **Syndrome grippal** : Fièvre élevée ( $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ) d'apparition brutale, ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL
- **Suspicion de dengue** : Fièvre élevée ( $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ) d'apparition brutale de moins de 8 jours, ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies) ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)
- **Diarrhées** : au moins 3 selles liquides ou molles / jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation
- **Fièvre isolée** : Fièvre élevée ( $> 38^{\circ}\text{C}$ ) de plus de 3 jours sans cause évidente

### Définitions utilisées pour la surveillance virologique

- **Cas confirmé de dengue** : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 / RT PCR / IgM

### Codage CIM 10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences

- **Syndrome grippal** : J11
- **Suspicion de dengue** : A90 - A91
- **Diarrhée** : A02 à A09
- **Fièvre isolée** : R509

### Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

- Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
- Centre de la mère et de l'enfant
- Réseau des médecins sentinelles
- Service de Santé des Armées
- Centre Hospitalier du Taaone
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae
- Institut Louis Malardé
- Laboratoires privés
- Cliniques privées Cardella et Paofai
- Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la Santé
- Pharmacies d'officine
- Centre d'hygiène et de salubrité publique
- Réseau informatique de santé publique de la Direction de la Santé

### Bureau de veille sanitaire :

**Responsable**  
Dr Henri-Pierre Mallet

**Epidemiologiste**  
Anne-Laure Berry

**Infirmiers**  
Jean-Paul Pescheux  
Auguste Buluc

**Secrétaire**  
Thilda Tehaamoana

Tél: 488 201

Fax: 488 212

**Astreinte : 706 502**

Mail : [veille@sante.gov.pf](mailto:veille@sante.gov.pf)