



Direction de la santé  
Bureau de veille sanitaire

# Bulletin de Surveillance Sanitaire

## Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

Données du 28 janvier au 3 février 2013  
(Semaine 05)

### A RETENIR

#### Syndrome grippal

- Activités syndromique et virologique en augmentation. Un cas de grippe A (H1N1) a été confirmé chez une jeune femme à Tahiti.

#### Syndrome dengue

- Activité syndromique faible ; aucun cas confirmé sur 17 prélèvements analysés.  
- En semaine 6, 2 cas de DEN-1 ont été confirmés chez 2 adultes à Moorea.

#### Diarrhées

- Activité en diminution.

#### Fièvre

- Activité faible.

### AUTRES ACTUALITES LOCALES

#### Salmonellose

- Quelques cas sont sporadiquement signalés (*S. enteritidis* et autres types).  
- Par mesure de précaution, il est toujours recommandé de consommer les œufs bien cuits : blanc et jaune (cuisson 5 minutes au minimum à 65°C).  
- Les mesures de contrôles mise en place ont permis d'affirmer l'absence de *Salmonella enteritidis* dans les élevages professionnels de poules pondeuses présents dans les îles.  
- Pour Tahiti, les mesures sanitaires d'abattage et de désinfection appliquées à tous les élevages incriminés, accompagnées de la mise en place de nouvelles mesures sanitaires efficaces permettent d'envisager la finalisation prochaine des opérations d'assainissement sanitaire des élevages de poules pondeuses professionnels.  
- A terme plus de deux tiers du cheptel concerné auront été éliminés et les contrôles réguliers sont suivis par les services de contrôle.

#### Leptospirose

- Suite aux importants épisodes pluvieux, le risque de leptospirose est toujours très important.  
- Bilan au 8 février 2013 : 15 cas de leptospirose ont été confirmés en décembre 2012, 17 cas en janvier et 2 cas en février.

### ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

(sources : InVS, PacNet, OMS, ProMed, autres)




#### Denque - Nouvelle-Calédonie

- Bilan au 11/02/2013 : depuis le début de la circulation du virus DEN I en Nouvelle-Calédonie en septembre 2012, 1844 cas ont été confirmés. 965 cas en janvier, et 406 cas depuis le 1er février : 242 en semaine 5 et 340 en semaine 6.  
- **Il est recommandé d'effectuer un prélèvement face à toute suspicion clinique de dengue, en particulier chez des personnes ayant voyagé en Nouvelle-Calédonie dans la semaine précédente.**  
- Pour information complémentaire, consultez le site internet de la DASS Nouvelle-Calédonie : [http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/observatoire\\_sante/veille\\_sanitaire/Dengue](http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/observatoire_sante/veille_sanitaire/Dengue)



#### Grippe

- En France métropolitaine, l'incidence de la grippe est toujours en hausse, particulièrement chez les enfants de moins de 14 ans (co-circulation de 3 virus : A(H3N2), A(H1N1) et B).  
- L'activité grippale reste minimale en Australie et en Nouvelle-Zélande.




## Grippe





## Fièvre isolée




## Dengue



## Diarrhées



## Indicateurs d'activité



### Bulletin téléchargeable sur les sites suivants :

- Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique [http://www.spc.int/phs/PPhSN/Surveillance/Routine\\_reports.htm](http://www.spc.int/phs/PPhSN/Surveillance/Routine_reports.htm)
- Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>

### Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelles

- **Syndrome grippal** : Fièvre élevée ( $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ) d'apparition brutale, ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL
- **Suspicion de dengue** : Fièvre élevée ( $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ) d'apparition brutale de moins de 8 jours, ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies) ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)
- **Diarrhées** : au moins 3 selles liquides ou molles / jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation
- **Fièvre isolée** : Fièvre élevée ( $> 38^{\circ}\text{C}$ ) de plus de 3 jours sans cause évidente

### Définitions utilisées pour la surveillance virologique

- **Cas confirmé de dengue** : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 / RT PCR / IgM

### Codage CIM 10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences

- **Syndrome grippal** : J11
- **Suspicion de dengue** : A90 - A91
- **Diarrhée** : A02 à A09
- **Fièvre isolée** : R509

### Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

- Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
- Centre de la mère et de l'enfant
- Réseau des médecins sentinelles
- Service de Santé des Armées
- Centre Hospitalier du Taaone
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae
- Institut Louis Malardé
- Laboratoires privés
- Cliniques privées Cardella et Paofai
- Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la Santé
- Pharmacies d'officine
- Centre d'hygiène et de salubrité publique
- Réseau informatique de santé publique de la Direction de la Santé

### Bureau de veille sanitaire :

**Responsable**  
Dr Henri-Pierre Mallet

**Epidemiologiste**  
Anne-Laure Berry

**Infirmiers**  
Jean-Paul Pescheux  
Auguste Buluc

**Secrétaire**  
Thilda Tehaamoana

Tél: 488 201  
Fax: 488 212

**Astreinte : 706 502**

Mail : [veille@sante.gov.pf](mailto:veille@sante.gov.pf)